


Staple® SL

(Pyriithiobac sodium 38,3% β/ο)



Το ζιζανιοκτόνο με μοναδική εκλεκτική μεταφυτρωτική δράση στο βαμβάκι

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 2 atm.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΖΙΖΑΝΙΑ	ΔΟΣΗ		ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρ. ή/στρ./στρ.	
Βαμβάκι	Αγριοβαμβακιά Βλήτο Κύπερη	18	20-40	ΒΑΜΒΑΚΙ από την ανάπτυξη του πρώτου φύλλου μέχρι τα 15 εκ. ύψος ΖΙΖΑΝΙΑ όταν έχουν 2-6 φύλλα

- Το **Staple® SL** ελέγχει μεταφυτρωτικά τα ζιζάνια:
 - Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*)
 - Βλήτο (*Amaranthus spp.*)
 - Κύπερη (*Cyperus spp.*)
- Εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.
- Να αποφεύγονται εφαρμογές όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες (κρύο, ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο).
- Τόσο τα βαμβακόφυτα όσο και τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ζωής ανάπτυξης και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πάνω από 21°C.
- Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ SIPCAM



STAPLE® SL

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70.157
Περίοδος έγκρισης: από 27-03-2018 έως 25-07-2018
Για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης

Ρωτήστε μας! | 210-6021860

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM
HELLAS

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
e-mail: info@sipcam.gr
www.sipcam.gr