

# V Envoke® 75WG

syngenta.

**ΠΡΟΫΛΛΕΣΙΣ:** •Φυλόδεσται κλειδωμένα και μακριά από παιδιά. •Μην τρώε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Μαζεύτε τη χυμένη ποστάτη. •Τα μοιλυμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. •Να οποφεύγεται η επειθεύρωση στα περιβάλλοντα. •Αποφεύγεται να αναπνείετε σκόνη/ αναβολίσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονίδιων / ατμούς/ εκνεύώματα. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα από μικρές προστασίες για τα μάτια/ το πρόσωπο. •Να φοράτε μακριμάνικη μπλούζα, μακριά παντελόνι και ειδικά προστατευτικά γάντια και γαντιά. •Διάθεση του περιεκτή σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθύνεται για βοήθεια στον γιατρό ή στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μοιλυμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με αδέσμο νερό για 15-20 λεπτά. Πλύνετε με αδέσμο νερό. Καθέτε το κέντρο δημητηρίασεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβούλιο. Εάν παρατηρηθεί ερεθίσματος του δέρματος, ζητεύετε/Επικερέψτε γιατρό. Βγάλτε τα μοιλυμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξανακρημοποιηθούν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Κρατήστε τα μάτια σας ανοικτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής – αν υπάρχουν – μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια σας με νερό. Καθέτε το κέντρο δημητηρίασεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατέβολτης: Καθέτε σημέρας στο κέντρο δημητηρίασεων. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας πει ο γιατρός ή το κέντρο δημητηρίασεων. Μη χρηγούντες υγρά στον παρόντα. Μη χρηγίζετε τίποτα από το σώμα σαν ο παρόντα δεν έχει τις αιθούσεις του.

Σε περίπτωση επιστολής: Μετακινήστε τον παρόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αντιμει, καθέτε χέμεα ιατρική βοήθεια και εφαρμόστε τεκτυπή αναπονή.

Καθέτε το κέντρο δημητηρίασεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβούλιο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**  
Μην πλένετε το εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγετε η ρύπανση μεταξύ των συστημάτων υποχεύοντας από τις λίθιστρωσες επιφάνειες και τους δρόμους.  
Να αφήσετε μία αιφέκστη ζώνη προσαστίας 10 μέτρων από επιφανειακά νερά και φτώτα μη στοχούς.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



**Τρόπος δράσης:** Το ENVOKE 75 WG απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και δρά σαν αναστόληση του ενδύματος ουγγαρικής συνέστασης (ALS). αναστέλλοντας έτσι τη βιοχυτική δύναμη σα ούγγεσης απορρέπεται αμινοεξέν για την ανάπτυξη του φυτού.

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτωτικό καθολικός ή κατευθυνόμενος στις γραμμές φεκαστικού.

**Τρόπος παρασκευής φεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την συνισταμένη ποσότητα ογκεδάματος αναδεύοντας. Συμπιερύσσουμε το φεκαστικό με το υπόντο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Φεκαστικό με ομέσως υπονεκτική ανάδευση.

**Φάσμα δράσης:**

**Βαμβάκι:** Για πλαταύφυλλα ζάχαρα: Κύπερο (*Cyperus esculentus*, *Cyperus rotundus*), Αριθμοβακτιά (*Abutilon theophrasti*).

**Δασ:**

1. 1,15\* γρ.οκ/στρέμμα (ταχ) με όγκο φεκ. υγρού 25-30 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή με καθολικό φεκαστικό μεταφυτωτικά από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων έως το στάδιο των 9 πραγματικών φύλλων για το βαμβάκι (BVCN 15-19).

2. 1,5-2\* γρ.οκ/στρέμμα (ταχ) με όγκο φεκ. υγρού 25-30 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο φεκαστικό ανάμεσα στις γραμμές μεταφυτωτικά από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων έως το στάδιο των 9 πραγματικών φύλλων για το βαμβάκι (BVCN 15-19).

**Παρατηρήσεις:**

1. Το οκέανασμα εμφανίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζάχαρα κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξής τους τα οποία δεν είναι σε κατάσταση stress.

2. Το οκέανασμα εμφανίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σε εδάφη με αυξημένη υγρασία.

3. «Οι μεγάλες δοσολογίες για εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της κύπερης.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Βαμβάκι:** 60 ημέρες

**Καθαρισμός φεκαστικών μπανανημάτων:**

Συνιστάται η χρήση αμμονικού διάσηματος (2 ήπτα ανά 100 λίτρα νερού).

**Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:**

1. Αδειάστε τελείως το βυτό με καθαρό νερό και κάντε το να περδεί μέρα από όλα τα μέρη του φεκαστικού (αντήλιο, φεκαστικό αυλό) και οδεύστε το ξανά.

3. Ξαναγείμετε το βυτό με καθαρό νερό στο οποίο προσθέτετε το αμμονικό διάσημα. Κυκλοφορήστε το διάσημα από μέσω όπου του συστήματος «λεκάνος» υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να οδεύσει.

4. Επαναλάβτε την ανωτέρω διάδικαση (προσθέτοντας πάλι αμμονία) δίπλα μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμονία. Χρησιμοποιείται το ίδιο διάσημα για την εξόπλιση των φίλτρων και των πικετ της οποία στέπονται ξεπλύνεται τα μεταβολικά ουγγαρικά φυτά.

# V Envoke® 75WG

syngenta.

**GROUP 2 HERBICIDE**
**UFI: TAU4-K08M-500D-A06K**
*Triflioxysulfuron  
(κημική ομάδα σουλφουνικούριες)*
**Εναιαρωματοποιήσιμοι κόκκοι (WC)**
**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70160**
**ΕΓΓΥΗΜΗΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**
*Triflioxysulfuron 75% β/β  
Βοηθητικές ουρές 25% β/β*
**Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτωτική καταπολέμηση πλαταύφυλλων ζιζανιών στο βαμβάκι.**

• Μπορεί να προκαλέσει απλήρωτη δέρματική ανείδρωση.  
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:**

A. ΠΕΛΛΑΣ, Δ. & M. Παπαδόπουλος 9,  
58100 ΠΑΙΑΝΝΙΣΑ, Τηλ.: 2382026489

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΕΧΗ:**

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,  
Δ. Ανθούπολης, Ανθούπολη Αττικής, 153 49,  
Τηλ.: 210 6666612-13, www.syngenta.gr  
ΟΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME™ are Trademarks of a Syngenta Group Company

1x100 gr e

οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φάιλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται πάντα πιο γρήγορα ή γρήγορα από τη σημερινή στιγμή για να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφύγεται την ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναπόθηξη με άλλη ζιζανιοκόπων διάφορεται το πρότυπο δράσης με την οποία συνέβασται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη συγκεκριμένη συσκευασία. Τα συκέασμα πρέπει να προστατεύεται στη δραστική ουσία triflioxysulfuron που οποιασδήποτε στην οποία πρέπει να προστατεύεται η ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη συσκευασία.

Συνέδεση συσκευασίας: Να το μανιφένευτε με άλλη σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούμενες ή προϊστοριογενές από τις οποίες το σκεύασμα υποβεί σε χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφύγεται την ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναπόθηξη με άλλη ζιζανιοκόπων διάφορεται το πρότυπο δράσης με την οποία συνέβασται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη συγκεκριμένη συσκευασία. Το σκεύασμα πρέπει να προστατεύεται στη δραστική ουσία triflioxysulfuron που οποιασδήποτε στην οποία πρέπει να προστατεύεται η ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη συσκευασία.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

• πρόρις ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας.

Σε περίπτωση αποχώρισης της καλλιέργειας υποβεί να επαναπαρθεί βαμβάκι μετά από 30 ημέρες από την επενδυτική επέμβαση με ENVOKE.

• πρόρις ή φύτευσης της καλλιέργειας που ακολουθούνται:

Η οπορά κειμενίου σταριού, βαμβακού και πάντα μεταφεύδημενος τομάριος επιτρέπεται την επόμενη καλλιέργεια περίοδο έως που λιπαρίστεται την επόμενη καλλιέργεια περίοδο. Η οπορά καλμποκιού, πλιάνου, ρύζιου, σόγιας, πατατάς και πάντα μεταφεύδημενου καπνού επιτρέπεται μετά από 2 καλλιέργεικες περιόδους. Η οπορά παρούσιασθεί πάντη καλλιέργειας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 μήνες από την εφαρμογή του ENVOKE 75 WG.

• της προβάσεως του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα;

Να μην εισέρχεστε στον αγρό πριν περάσουν 12 ώρες από το πλεόνασμα.

Συστοιχία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλίων και καθε αλλής παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Μεταφυτωτικές εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν κιρρήσμα των φύλλων και μειωμένη ανάπτυξη των μεριγονατών διαδηματών από πάλι τα συμπότιμα είναι παρόδια και η απόδοση της καλλιέργειας δεν επιτρέπεται.

Χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήπιο και υγρασία σε καλή αερίζομενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.