

SYLLIT® 544 SC

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
544 g/L ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ DODINE




Συσκευασίες:
1L & 5L

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΤΟ SYLLIT 544 SC ΣΕ ΜΗΛΟΕΙΔΗ & ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

- Προληπτική & θεραπευτική δράση σε Φουζικλάδιο Μηλοειδών, Εξώασκο, Ροδακινιάς, Ανθράκνωση & Κυλινδροσπορίωση Κερασιάς
- Μοναδικός τρόπος δράσης: Διασυστηματικό - σύμφωνα με το FRAC - ομάδα U12
- Ταχύτατη διείσδυση στο φυτικό ιστό (εντός 2 ωρών από τον ψεκασμό)
- Διαχείριση της ανθεκτικότητας (μοναδική δραστική ουσία)
- Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή
- Ευρωπαϊκά MRLs

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο:
www.upl-ltd.com/gr



SYLLIT 544 SC

Το προϊόν **SYLLIT 544 SC** είναι ένα εκλεκτικό μυκητοκτόνο που παρέχει προληπτική καθώς και θεραπευτική δράση στο **Φουζικλάδιο** των **Μηλοειδών**, στον **Εξώασκο** της **Ροδακινιάς**, στην **Κυλινδροσπορίωση** & **Ανθράκνωση** της **Κερασιάς** διασφαλίζοντας στους παραγωγούς υψηλή & ποιοτική παραγωγή. Η **dodine** είναι μοναδική

δραστική ουσία και ανήκει στην οικογένεια των γουανιδινών. Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τις υπόλοιπες κατηγορίες μυκητοκτόνων (στρομπιλουρίνες, καρβοξαμικά, τριαζόλες, ανιλινοπυριμιδίνες, προϊόντα επαφής...) και για το λόγο αυτό το **SYLLIT 544 SC** αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1


Το SYLLIT 544 SC διεισδύει & ενσωματώνεται στη μεμβράνη του μύκητα

2

Η μεμβράνη του μύκητα διαταράσσεται και χάνει τη συνοχή της

3

Η μεμβράνη αποδομείται με αποτέλεσμα τη θανάτωση του μύκητα



ΜΗΛΟΕΙΔΗ

• Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόσεις κ.εκ. σκ./στρ. (max)	Χρόνος Εφαρμογής	M.A.E/ M.E*	PHI (σε ημέρες)
 ΜΗΛΟΕΙΔΗ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	125	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2 / 7-10 ημέρες	60

* M.A.E/ M.E.: Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)



Στα μηλοειδή, το **SYLLIT 544 SC** έχει προληπτική δράση μέχρι 7 ημέρες, αλλά συνιστάται προσαρμογή του χρονικού διαστήματος εφαρμογής κατά την ανάπτυξη των φύλλων. Η θεραπευτική του δράση διαρκεί έως και 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχόπτωσης που προκάλεσε τη μόλυνση.

Το **SYLLIT 544 SC** καταστρέφει την ανάπτυξη των βλαστικών σωλήνων των σπορίων πριν τη διείσδυση τους στην επιδερμίδα. Επίσης είναι δραστικό έναντι τόσο των ασκοσπορίων όσο και των κονιδίων. Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την εμφάνιση της ασθένειας.

BBCH -
Βλαστικά στάδια
Μηλιάς & εφαρμογή
του SYLLIT® 544 SC



Γιατί να χρησιμοποιήσετε το SYLLIT® 544 SC στην αρχή της βλαστικής περιόδου

Το **SYLLIT 544 SC** εμφανίζει εξαιρετική προστατευτική δράση κατά του Φουζικλαδίου. Εφαρμοζόμενο από την πράσινη κορυφή (BBCH 01) προστατεύει τα σέπαλα τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην προσβολή από το Φουζικλάδιο. Οι πρώιμες μολύνσεις στα σέπαλα αποτελούν πηγή μολυσμάτων, τα οποία έρχονται σε επαφή με τους νεαρούς καρπούς.

Συνθήκες που επικρατούν στην αρχή της βλαστικής περιόδου

Σέπαλα: πρώτοι, πολύ ευαίσθητοι πράσινοι ιστοί

Διαχειμάζοντα μολύσματα Φουζικλαδίου

Παρουσία υγρασίας και βρεγμένη φυλλική επιφάνεια

Συχνές βροχοπτώσεις

Χαμηλές θερμοκρασίες

Αναγκαιότητα εναλλαγής μυκητοκτόνων για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας

Το SYLLIT 544 SC δίνει τη λύση

Εξαιρετικός έλεγχος του Φουζικλαδίου στα σέπαλα

Εξαιρετικά αποτελεσματικό τόσο στα ασκοσπόρια όσο και στα κονιδιοσπόρια

Εφαρμόζεται ακόμα και σε βρεγμένο φύλλωμα

Αντοχή στην έκπλυση μετά από 2 ώρες

Η αποτελεσματικότητα είναι εξαιρετική και σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες

Μοναδική οικογένεια μυκητοκτόνων




ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

• Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόσεις κ.εκ. σκ./στρ. (max)	Χρόνος Εφαρμογής	M.A.E/ M.E*	RHI (σε ημέρες)
 ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	Εξώασκο (<i>Taphrina deformans</i>)	165	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και / ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι & μετά την πτώση τους (φθινόπωρο)	2 / 7-10 ημέρες	75
 ΚΕΡΑΣΙΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑ	Ανθράκνωση (<i>Arionnoma erythrostoma</i>), Κυλινδροσπορίωση (<i>Blumeriella jaapii</i>)	125	Από την από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή	2 / 7-10 ημέρες	14

* M.A.E/ M.E.: Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)

BBCH - Βλαστικά στάδια Ροδακινιάς



BBCH - Βλαστικά στάδια Κερασιάς



SYLLIT 544 SC

SYLLIT 544 SC



SYLLIT 544 SC

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	Dodine 54,4 % β/ο
ΜΟΡΦΗ	Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
ΑΑΔΑ	60.592/ 04.01.2017
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	1L, 5L

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής
- Εμφανίζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και στους οφθαλμούς (δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη φυλλώματος)
- Προστατεύει όλα τα ευαίσθητα μέρη του φυτού: φύλλα, μίσχους, σέπαλα, καρπούς
- Συνεχίζει να διαπερνά τον φυτικό ιστό ακόμη και αν ακολουθήσει βροχόπτωση στις επόμενες 2 ώρες από την εφαρμογή καθώς επίσης, εφαρμόζεται και σε βρεγμένη επιφάνεια
- Σιγουριά για το αποτέλεσμα ακόμη και μετά από βροχόπτωση
- Εξαιρετική δράση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι - Τ.Κ. 152 33

Τ: 210 55 78 777

www.upl-ltd.com/gr



Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο δεν αποτελούν σύσταση παρά μόνο οδηγίες για την ορθή χρήση των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον επίσημο ιστότοπο μας www.upl-ltd.com/gr. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην UPL και σε άλλους παρασκευαστές και ενδέχεται να υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες των προϊόντων πριν από τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη UPL Ελλάς.